

幼儿常见疾病及意外事故:幼儿常见病的预防教师资格证考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_BC\\_E5\\_84\\_BF\\_E5\\_B8\\_B8\\_E8\\_c38\\_647580.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_B9_BC_E5_84_BF_E5_B8_B8_E8_c38_647580.htm) 第二节 幼儿常见病的

预防

一、上呼吸道感染(上感) 上感是由细菌或病毒引起的鼻咽部炎症。体弱儿常反复发生上感。(一)症状 1. 上感症状轻重不同。较大儿童多为鼻咽部症状。鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，咳嗽、乏力，可有发热，一般经3~4天可自愈。 2. 可能引发急性化脓性中耳炎、淋巴结炎、气管炎、支气管炎等。 3. 若出现高热持续不退、咳嗽加重、喘憋等症状时需及时诊治。(二)护理和预防 1. 护理 病儿宜卧床休息，多喝开水。饮食应有营养、易消化。 2. 预防 应加强锻炼，多组织幼儿在户外活动。早晨坚持用冷水洗脸。组织幼儿户外活动时，穿戴不宜过暖，并根据季节变化，提醒幼儿增减衣服。合理安排饮食，保证幼儿的营养需要。

二、腹泻 (一)病因 1. 感染。因吃了被细菌、病毒、霉菌污染的食物，或食具被污染，引起胃肠道感染，夏秋季多见。 2. 饮食不当。多发生于人工喂养的婴儿。 3. 腹部受凉，贪吃冷食冷饮，可引起腹泻。(二)症状 1. 腹泻症状轻的，一旦泻数次至十余次，大便稀糊状或蛋花汤样，体温正常或低热，不影响食欲。 2. 腹泻严重者多因肠道内感染所致。(三)护理和预防 1. 护理 (1)腹部保暖；每次便后用温水洗臀部；(2)已有脱水，无论程度轻重，均应立即送医院治疗。无脱水，可服“口服补液盐”，根据袋上注明的量，倒入适量凉开水，搅匀后即可饮用；(3)不要让腹泻的小儿挨饿。 2. 预防 合理喂养婴幼儿，提倡母乳喂养，合理添加辅食，合理断奶。

三、弱视 (一)病因 弱

视是指视力达不到正常，但查不出影响视力的明显眼病，验光配镜也不能矫正。弱视是儿童视觉发育障碍性疾病。弱视的原因包括：1．先天性弱视；2．斜视性弱视；3．屈光参差性弱视；4．形觉剥夺性弱视。(二)危害 正常视功能包括立体视觉，即物体虽然在两眼视网膜上单独成像，但大脑能将其融合成一个有立体感的物像，称双眼单视功能。儿童弱视，不能建立完善的双眼单视功能，难以形成立体视觉。(三)治疗和预防 弱视、斜视的治疗愈早愈好。因此，早期发现，积极治疗弱视和斜视，就成为恢复患眼正常视觉功能的关键因素。幼儿园应定期给幼儿查视力。

#### 四、急性结膜炎

(一)病因、症状 急性结膜炎俗称“红眼病”，是由病毒或细菌引起的传染性眼病。以春夏季多见。细菌性结膜炎一般常有脓性及粘性分泌物，早上醒来时上下眼睑被粘住，服睛怕光，疼痛，有异物感。病毒性结膜炎症状略轻，眼分泌物多为水样。结膜炎的发炎部位是眼球表面及上下眼睑。内侧的结膜发炎，表现为白眼珠发红，故名“红眼病”。

(二)护理和预防

- 1．护理 可用生理盐水或硼酸溶液洗眼睛。白天点眼药水、晚上用眼药膏。
- 2．预防 教育幼儿不用手揉眼睛。手绢、毛巾等要专用，用后煮沸消毒。用流动水洗脸。

#### 五、蛔虫病

(一)症状 虫卵在小肠内发育成幼虫，经小肠壁进入血液，随血液循环至肺，再由肺到气管、咽，重新被人咽进消化道，在小肠定居，发育为成虫。成虫在肠道内定居，剥夺儿童的营养，可使儿童患营养不良、贫血等疾病。

(二)治疗和预防

- 1．服驱虫药，驱蛔。可于每年九十月份集体驱蛔。
- 2．蛔虫病重在预防，应注意环境卫生、粪便无害化处理。

#### 六、蛲虫病

(一)症状 雌虫夜间产卵使肛门奇痒，影响睡眠，间接影响小儿

的精神、食欲。因瘙痒抓破皮肤可使肛门周围皮肤发炎。(二)治疗和预防 蛲虫成虫寿命仅1个月，如果采取严格的卫生措施，经1~2个月可自愈。病儿应穿封裆裤睡觉，以防散播虫卵及污染手，可在睡前用蛲虫药膏，涂抹在肛门周围，早晨用温水洗净并换内裤，洗净消毒。相关知识：幼儿常见疾病及意外事故:幼儿常见传染病的预防 幼儿的日常保育与能力的培养:幼儿的着装 幼儿的日常保育与能力的培养:幼儿的睡眠 幼儿的日常保育与能力的培养:幼儿的膳食 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)