

2010年口腔医师辅导：根尖诱导成形术的治疗阶段及步骤
口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648041.htm

1.治疗阶段（1）第一阶段：消除感染和尖周病变，诱导牙根继续发育。（2）第二阶段：根管永久充填，使根尖孔封闭。两个阶段之间的间隔时间或牙根继续发育所需时间不等，约为6个月至2年左右。其时间的长短和牙根原来的长度、根尖倒炎症的程度以及患者的机体状况等有关。

2.治疗步骤 来源：考试大（1）常规备洞开髓：制洞开髓的位置和大小应尽可能使器械直线方向进入根管。（2）根管预备：仔细击除根管内感染坏死牙髓组织，并用3%过氧化氢溶液、生理盐水反复冲洗，清除残留的感染组织。对于有急性症状的患牙，应先做应急处理，开放根管，建立有效引流，待急性炎症消退后再继续治疗。（3）根管消毒：吸干根管，封消毒力强刺激性小的药物于根管内，如木榴油、樟脑酚、碘仿糊剂或抗生素药物等，每周更换1次，至无渗出或无症状为止。有根尖周病变的患牙，可封入抗生素糊剂，每1~3个月更换1次，至根尖周炎症被控制为止。

来源：考试大（4）药物诱导：根管内填入可诱导根尖成形的药物氢氧化钙制剂。先取出根管内封药，用根管器械将调制好的氢氧化钙糊剂填入根管内，逐层填入，填满根管，使其接触根尖部组织。如根尖端残留活髓，将氢氧化钙糊剂填到髓断面即可。（5）暂时充填窝洞，随访观察：应在治疗后3~6个月复查一次，至根尖形成或根端闭合为止。复查时除注意有无临床症状，如：有无疼痛、肿胀，有无瘘管，

叩诊是否疼痛，牙齿松动度情况及能否行使功能等。还应摄取X线片，观察根尖周情况和根尖形成状态。采集者退散（6）

）常规根管充填：当X线片显示根尖延长或有钙化组织沉积并将根端闭合时，可行常规根管充填。根管充填后可继续随访观察。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题口腔执业医师加入收藏相关推荐：2010年口腔医师辅导：根尖诱导成形术的适应证和治疗特点 2010年口腔医师辅导：牙齿萌出后牙根继续发育所依赖的组织

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com