

2010年内科辅导：甲状旁腺功能亢进病因临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648124.htm 甲状旁腺功能亢进病因主要包括

以下几点：1.原发性甲旁亢 小儿不常见，往往在10岁后发病，因腺瘤或增生引起，亦可为家族遗传性疾病，家族中成人受侵犯较多，但可有1/3儿童受累，某些症状不明显，须经详细检查才能发现。如同时伴有胰岛、胃泌素瘤及垂体腺瘤，则称为多发性内分泌腺瘤病I型的卓艾综合征

(ZollingerEllisonSyndrome)。另一些家族中可伴有甲状腺髓样癌及嗜铬细胞瘤，称为多发性内分泌腺瘤病 II型的Sipple综合征。以上两综合征均属常染色体显性遗传。尚有一类家族遗传性甲旁亢是由腺体Clearcell增生所致，为常染色体隐性遗传，多在婴儿期发病，病势凶险，进展迅速，不及时诊治可造成死亡。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda

.com) 2.继发性甲旁亢 由于细胞外液中Ca²⁺浓度减低致使甲状旁腺分泌增多，腺体增生，多见于佝偻病、粥样泻及慢性肾脏疾病患儿。尚有新生儿甲旁亢亦属此类型，由于母亲有甲旁低，胎儿于子宫内即可有甲状旁腺增生，表现在X线长骨相有甲旁亢改变。此病多为暂时性，出生后可渐痊愈。本文来源:百考试题网

3.三发性甲旁亢 在继发性甲旁亢的基础上腺体分泌过多的甲状旁腺激素以纠正低血钙，有些病例PTH的分泌，由代偿性分泌过多变成自发性的分泌，结果血清钙由原来的低值或正常值变为高于正常水平。近几年来由于透析疗法及肾移植增多，故三发性甲旁亢

(tertiaryhyperparathyroidism)亦显著增加。百考试题论坛 4.

假性甲旁亢成人多见。某些恶性肿瘤能分泌PTH样物质，因而出现高血钙、低血磷及甲旁亢症状，如支气管肺癌，肾上腺肿瘤，泌尿生殖道、肝、胰、淋巴结、食管与结肠等部位的肿瘤等。临床还有明显消瘦，病情进展快，无肾钙化和消化道溃疡史，血钙常在 3.5mmol/L （ 14mg/dl ）以上，碱性磷酸酶增高而无骨损害，PTH正常。更多信息请访问：百考试题 医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏
相关推荐：2010年内科辅导：甲亢伴糖尿病怎样治疗 2010年内科辅导：甲亢的早期征象特点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com