

2010年内科辅导：膀胱肿瘤的病理和临床表现
临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648127.htm 膀胱肿瘤是泌尿系统中最常见的肿瘤，绝大多数为恶性肿瘤。病因尚不清楚，可能与化工制剂、染料、油漆、印刷、烟草的污染有关。（一）病理 膀胱癌的组织类型、细胞分化、生长方式和浸润深度均与预后有关。其中细胞分化程度和浸润深度对预后的影响最大。上皮性肿瘤占95%以上，其中90%为移行细胞乳头状肿瘤；鳞癌和腺癌各占2%~3%，恶性程度较高，呈浸润性生长。非上皮性肿瘤罕见，由间质细胞发生，多数为肉瘤，如横纹肌肉瘤，好发于婴幼儿。按肿瘤细胞大小、形态、染色、核仁改变、分裂象等将肿瘤细胞分化程度分为三级：Ⅰ级分化良好，属低度恶性；Ⅱ级分化不良，属高度恶性；Ⅲ级分化居Ⅰ、Ⅱ级之间，属中度恶性。肿瘤浸润程度是肿瘤临床分期（T）的依据，多用TNM分期标准，分为：原位癌（Tis）；乳头状无浸润Ta；限于黏膜固有层以内T1；浸润浅肌层T2；浸润深肌层或浸润膀胱周围脂肪组织T3；浸润前列腺、子宫、阴道及盆腔等邻近器官T4。临床上习惯将Tis、Ta和T1期肿瘤称为表浅膀胱癌。采集者退散 肿瘤分布在膀胱侧壁及后壁最多，其次为三角区和顶部。可为多中心。肿瘤的扩散主要向深层浸润，直至膀胱外组织。淋巴转移常见，浸润浅肌层者约50%淋巴管内有癌细胞；浸润深肌层者几乎全部淋巴管内有癌细胞；浸润至膀胱周围组织时，多数已有远处淋巴结转移。血行转移多在晚期，主要转移至肝、肺、肾和皮肤处。（二）临床表现 发病年龄多数在50~70岁，男:女为4:1。血尿是膀胱

癌最常见和最早出现的症状。常表现为间歇性无痛性全程肉眼血尿，可自行减轻或停止。尿频、尿急、尿痛多为膀胱肿瘤的晚期表现。位于膀胱三角区或膀胱颈部的肿瘤可造成膀胱出口梗阻，造成排尿困难，甚至尿潴留，亦可有终末血尿、尿频和尿痛。来源：考试大 浸润癌晚期，在耻骨上可触及包块、质硬，排尿后不消退。肿瘤阻塞输尿管可致肾积水、肾功能不全等。肿瘤广泛转移时，可出现骶腰部疼痛、下肢水肿、贫血体重减轻等。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科辅导：肾癌的病理和临床表现 2010年内科辅导：膀胱肿瘤诊断和临床处理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com