

2010年内科辅导：膀胱结石的诊断临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648133.htm

原发性膀胱结石多发生于男孩，与营养不良和低蛋白饮食有关，其发生率在我国已明显降低。继发性膀胱结石常见于良性前列腺增生、膀胱憩室、神经源性膀胱、异物或肾、输尿管结石排入膀胱。1.B超 膀胱区可探及结石声影，还可同时发现膀胱憩室、良性前列腺增生等病因。百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda . com) 2.X线检查膀胱区平片能显示绝大多数结石。疑有上尿路结石时，应拍腹部平片及排泄性尿路造影。3.膀胱镜检查 能直接看到结石及膀胱内其他病变。来源：考试大 4.直肠指检 较大的结石常可经直肠腹壁双合诊被扪及。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科辅导：上尿路结石的临床表现 2010年内科辅导：上尿路结石的治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com