

2010年外科辅导：断肢的急救处理临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A4\\_96\\_c22\\_648153.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648153.htm)

1.现场急救 急救时需将病人和断离的肢体尽快地、安全地送到医院。断肢的近侧端用清洁敷料加压包扎，以防大出血，最好不要用止血带。对于不能控制大出血而必须应用止血带者，则每小时应放松1次，放松时应用手指压住近侧的动脉主干，以减少出血。对于大部断离的肢体，在运送前应用夹板固定伤肢，以免在转运时引起再度损伤。断离下来的肢体其断面用消毒敷料覆盖包扎，以减少感染。设法及时以干燥冷藏方法予以保存，先将断肢装入塑料袋，袋口扎紧后放入不透水的容器，如搪瓷杯，上盖后放入盛有冰块保温瓶中。在病人发生严重休克时，应首先及时处理休克，以防止转运途中发生生命危险。

2.急诊室处理 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) (1)迅速了解受伤史，全面地进行全身和受伤肢体创口、断肢情况的检查。抽血检验血型、血常规，并配好同型血1000~2000ml。同时常规给予破伤风抗毒血清，必要时导尿。(2)抗休克。(3)摄肢体X线片或加摄头颅、胸部或腹部的平片。 本文来源:百考试题网 (4)通知手术室立即做好断肢再植的清创与再植手术的器械准备。(5)通知有关手术医师和麻醉医师，尽速做好手术前准备。(6)如发现伤者有严重合并损伤而危及生命时，应首先请有关科室协同处理。 更多信息请访问：[执业医师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业医师加入收藏相关推荐](#)：

2010年外科辅导：断肢再植术后期的功能恢复及功能评定  
2010年外科辅导：断肢再植的术后处理 100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)