

2010年外科辅导：断肢再植术后后期的功能恢复及功能评定
临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648156.htm

断离肢体经再植手术后，经2~3周观察，血液循环情况保持良好，伤口情况渐趋愈合，此时可认肢体基本存活。进一步是骨折的愈合，周围神经的再生，肢体感觉和关节活动的恢复。为了使再植肢体的功能得到最大限度的恢复，应行体育疗法和物理疗法，对再植肢体定期检查，以决定是否需行功能重建手术。来源：考试大再植肢体一旦存活，即使功能恢复不理想，但病人总是不愿把接活的，没有功能的肢体拿掉。除非有下述情况可考虑截肢：
再植肢体剧烈疼痛，经久不愈。再植肢体并发慢性骨髓炎或化脓性关节炎，创口经久不愈。下肢严重不等长和畸形缩短的再植肢体不穿置矫形鞋或假肢不能行走，并由于再植肢体的存在妨碍合适假肢的装配。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：断指再植 2010年外科辅导：断指再植手术指征 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com