

2010年内科辅导：口服降糖药物的合理使用临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_86\\_85\\_c22\\_648164.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648164.htm) 首次确诊的糖尿病人口服降糖药的选择。若病人首次确诊时有典型的多饮、多尿及体重减轻的症状，不必先试用单纯饮食治疗。若无酮尿，可立即开始使用口服SU类降糖药，同时配合饮食控制。若病人首次确诊后，没有症状或症状很轻者，可先进行单纯饮食治疗一个月，此时医护人员对病人进行教育，使病人了解糖尿病的基本知识及饮食控制的重要性，能自觉地与医生配合。此段时间也可配合运动锻炼，尤其是肥胖病人更应以运动减轻体重。本文来源:百考试题网 口服药物使用中常见的错误：错误联用：磺脲类药物的重复应用。如：消渴丸优降糖，美吡达糖适平。服药时间错误。口服药物时忽视饮食和运动治疗。百考试题 - 全国最大教育类网站([www.Examda.com](http://www.Examda.com)) 口服药物不能坚持下去。复查血糖时不服药。更换太频繁。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科辅导：糖友服用降糖药时间很关键 2010年内科辅导：糖尿病患者药物治疗三特性 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)