

2010年内科辅导：糖尿病患者多药并用要谨慎临床执业医师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648167.htm 一个人同时服用两种或两种以上的

药物时就称为合并用药。合并用药时，有些药物会受到其他药物的干扰或影响，即有药物交叉反应，最常见的药物交叉反应是药物的拮抗作用和协同作用。糖尿病患者合并用药尤其要小心，因为在治疗糖尿病期间，同时又服用一些其他药物，可因这些药物易与甲磺丁脲、优降糖等降糖药发生拮抗作用，从而降低降糖药物的疗效；也可发生协同作用，使血糖降得太低，甚至还会引起低血糖昏迷，如果发现和处理不及时，有时还会危及生命。糖尿病病人在服用降糖药期间，最好不要同时服用以下药物：阿司匹林阿司匹林可使口服降糖药代谢与排泄减慢，会增加磺脲类药物的药效，加上其本身也有降糖作用，合用会使血糖降得过低，易引起低血糖昏迷。心得安等 受体阻滞剂心得安能降低血压，阻碍肝糖原释放葡萄糖，使血糖降低，促使胰岛分泌胰岛素，掩盖低血糖引起的心律增加等征象，与口服降糖药同服，可造成低血糖昏迷。故糖尿病人服用心得安要十分谨慎。抗凝血药如双香豆素，可抑制D860的代谢，延长其半衰期，容易发生低血糖。采集者退散 氯霉素可抑制肝内药酶的活性，降低降糖药物的代谢，易引起低血糖。复方新诺明可加强口服降糖药的作用，应用时要注意调整降糖药的药量。糖皮质激素类如强的松、可的松、地塞米松等，这些药物能增加肝糖原的合成，减少组织对糖原的利用和分解，使血糖升高，故得名糖皮质激素，是糖尿病患者禁用的药物。抗结核药异烟肼、利

福平能促进肝脏分泌较多的药酶加速D860的代谢与排泄，从而缩短D860的半衰期，影响降血糖作用，降低降糖药的疗效，使血糖升高。雌激素、黄体酮和口服避孕药它们能降低降糖药的疗效。百考试题 - 全国最大教育类网站([www . Examda . com](http://www.Examda.com)) 速尿、利尿酸、双氢克尿噻等利尿药它们能抑制胰岛素的分泌，使血糖升高。四环素、土霉素、庆大霉素等可产生大量乳酸，引起病人酸中毒。烟酸可引起糖耐量下降，并通过末梢组织抑制对葡萄糖的利用。本文来源:百考试题网 另外，抗精神病药物如氯丙嗪、奋乃近等具有升高血糖的作用。重症糖尿病患者应慎用一些含糖分过多的药物，如各类口含片、咀嚼片常添加蔗糖作为甜味剂，因其所含糖分较多，其药品说明书上一般都有说明。糖尿病病人忌饮酒，其主要原因是酗酒能抑制肝内药酶的活性，从而引起低血糖。糖尿病病人应当注意：当刚换了某种糖尿病口服药的类型及剂量并且正在服用其他药物，或者只服用一种口服药，但刚用过某种非处方药物时，如果这时血糖无明显原因失去控制，或者出现高血糖、低血糖的症状，一定要考虑到可能是由某些药物的交叉反应造成的。如果怀疑是其他药物影响糖尿病口服药的效果，应当立即去看医生，请医生指导，千万不可自行换药或盲目加药，否则，可能造成不良后果。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科辅导：不能与降糖药同时使用的药物 2010年内科辅导：糖友降糖药不一定都饭前吃 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com