

2010年内科辅导：糖友降糖药不一定都饭前吃临床执业医师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648169.htm 大部分的降糖药都需要饭前半小时吃，有利于控制好饭后血糖。第四军医大学唐都医院内分泌代谢科主任焦凯指出：不是所有的患者和所有的降糖药都在饭前吃，吃药时间要看血糖和药物反应的高峰期能否达到一致。焦主任介绍说，双胍类降糖药一般要求饭前半小时吃，服药两小时后药效达到高峰，此时，进食的食物也被人体消化吸收，血糖也接近高峰。但吃药后感到恶心、呕吐等胃肠医学教育网搜集整理道反应较大的患者，需要在饭后吃双胍类降糖药。而格列奈类的降糖药应该是饭前几分钟吃最好，因为它起效较快，在服药半小时到一小时药效达到高峰，如果吃得过早，食物还没有消化完，没有引起血糖升高时，容易引发低血糖，且控制不好餐后血糖。琢-葡萄糖糖苷酶抑制剂这类药最好在吃第一口饭的时候，把药也嚼碎吃下，因其起效很快，加上嚼碎后对药物的吸收更好，就可以在消化的同时控制好血糖。总之，要多和医生沟通怎样吃药更合适。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年内科辅导：服用降糖药11条需牢记 2010年内科辅导：注意降糖药的毒性反应 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com