

2010年外科辅导：耳源性脑脓肿应该如何治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648231.htm

1.用足量、敏感的抗生素及磺胺类药物。 2.颅内压增高时，可用脱水疗法以降低颅内压，酌情应用尖固醇激素类药物等。采集者退散 3.及时行乳突探查术，清除乳突病灶，除去破坏的骨板至暴露正常脑膜，自乳突腔穿刺、切开排脓。 4.注意支持疗法及水与电解质平衡。

来源：www.100test.com 5.出现脑疝或脑疝前期症状时，应立即静脉推注20%甘露醇，气管插管，给氧，人工呼吸，并紧急作钻脑脓肿穿刺术，必要时行侧脑室引流，降低颅压，以挽救生命。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：胆管良性狭窄应该做哪些检查 2010年外科辅导：胆管良性狭窄应该如何治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com