

2010年外科辅导：骨性关节炎诊断检查临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648364.htm

本病无特异性的实验室检查，但赖此可进一步与其他疾病鉴别。血沉在大部分患者正常，C反应蛋白不增高，类风湿因子阴性。关节液呈黄色或草黄色，粘度正常，凝固试验正常，其白细胞含量低于 $2 \times 10^9/L$ ，糖含量很少低于血糖水平的50%。关节的X线检查有助于本病诊断。受累关节在X线上按病情轻重而出现以下改变：1、关节间隙变狭；2、软骨下骨质硬化；3、关节缘有骨赘形成；4、软骨下骨质出现囊性变，有极少数患者出现船穿凿样骨改变；5、骨变形包括股骨头呈扁平样改变和（或）关节半脱位。应该指出，不少具有上述X线影响变化者并无本病的临床症状。

诊断和鉴别诊断 美国风湿病学院（ACR）制定的骨性关节炎分类标准如下；（一）手关节标准 有手关节痛或僵硬，伴以下四条中至少三条者。来源：考试大 1、双手第2、3指的远指和近指关节和第一腕掌关节，此103关节中有2个或更多的关节呈硬组织的肥大。 2、有至少2个远指关节呈硬组织的肥大。 3、掌指关节受累（肿胀）少于3个。 4、上述10个关节中至少有1个出现畸形。（二）膝关节标准 有膝痛及该膝X相示有骨赘，是伴有下述任一条者。 1、年龄 > 50岁。 2、受累膝僵硬 < 30min。 3、有骨摩擦音。（三）髌关节标准 髌痛同时有以下三条中至少两条者。 1、血沉 < 20mm/第1h 2、X线示股骨或股骨头有骨赘 3、X线示至少有关节腔狭窄 来源：考试大的美女编辑们 骨性关节炎宜与下述疾病鉴别：一、类风湿关节炎 两者都累积指关节、膝关节等

，然而类风湿以近指关节和掌指关节的病变为突出，且关节肿痛、滑膜炎远较骨性关节炎明显，很少出现Heberden结节，且类风湿因子阳性，血沉增快。二、银屑病关节炎亦易累及远指关节但X线表现与骨性关节炎不同。患者皮肤有银屑病皮疹。来源：www.100test.com 三、假性痛风为焦磷酸钙晶体沉着于关节软骨、滑膜、包膜、韧带而引起局部关节（其中以膝受累多见）的肿痛，X线表示关节软骨面有钙化线，关节液中可找到焦磷酸钙的结晶。后两者可与骨性关节炎鉴别。四、其他根据患者年龄、临床表现、X线特点而将本病与髌关节结核、无菌性骨坏死鉴别。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能 加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：骨性关节炎病理生理 2010年外科辅导：骨性关节炎疾病病因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com