

2010年口腔医师辅导：新生儿颌骨骨髓炎治疗原则口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648381.htm

新生儿上颌骨骨髓炎发病急、病情重、全身症状变化快，在治疗上应采取积极而有效的措施。临床上首先应用大量有效抗生素，同时应注意患儿全身情况的变化，给予必要的对症及支持疗法，并根据细菌培养及药物敏感试验结果调整抗生素。一旦眶周、牙槽骨或腭部形成脓肿，要及早切开引流。如果全身中毒症状明显而局部虽未进入化脓期，必要时施行早期切开引流，也可获得缓解全身中毒症状及防止局部感染继续扩散的效果。新生儿上颌骨骨髓炎急性期如果处理得当，可得到治愈，而不转入慢性期。 本文来源:百考试题网 新生儿上颌骨骨髓炎常有瘻孔排脓，换药时，最好用青霉素等抗生素溶液冲洗，效果较好。口内有瘻孔者应注意防止脓液误吸引起肺部并发症。采集者退散 如病情转入慢性期，已形成死骨，但全身症状好转，局部肿胀基本消退，死骨清除术亦不急于进行，因新生儿或婴幼儿上颌骨骨壁较薄，骨质松软，死骨片均较小，往往可随脓液从瘻孔排出而自愈。如果牙胚受炎症侵及而坏死，不能从瘻管排出时，可略扩大创口取出坏死牙胚，但未感染的牙胚要尽量保留。如死骨较大不能排出，手术摘除时也要尽量保守，仅摘除已分离的死骨，否则会加重颌骨破坏，影响颌骨发育，遗留颌面及牙颌系统畸形或咬合功能紊乱。 来源：考试大的美女编辑们 新生儿上颌骨骨髓炎治愈后，面部及眶周遗留的瘢痕畸形，可待适当时机进行二期整复手术。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考

试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年口腔医师辅导：新生儿颌骨骨髓炎病因 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com