

2010年儿科护理：新生儿缺氧缺血性脑病临床特点临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_648402.htm 根据意识、肌张力、原始反射改变、有无惊厥、中枢性呼吸衰竭等，临床可分为轻、中、重三型。鉴别重点：来源：考试大的美女编辑们 轻度：出生24小时内症状最明显（症状持续时间）；肌张力正常（肌张力）；患儿多发生过度兴奋（意识）；预后良好（预后）。中度：出生24至72小时症状最明显；肌张力减弱；患儿多出现嗜睡；可能有后遗症。来源：考试大 重度：出生24至72小时或以上症状最明显；肌张力低下；患儿多出现昏迷；必有后遗症。另外，题干中提示原始反射减弱或发生惊厥，就不考虑轻度，中度或重度。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年儿科护理：新生儿缺氧缺血性脑病的定义 2010年儿科护理：新生儿复苏常用药物剂量表 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com