

2010年儿科护理：新生儿窒息的复苏程序临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_648407.htm

(1) 最初复苏处理：置保暖处，摆好体位，吸净黏液，揩干全身，触觉刺激。
百考试题论坛 (2) 有自主呼吸，且心率 > 100 时：则评价皮色，如皮色红润或仅手足发绀，继续观察；如皮色发绀，则给 $80\% \sim 100\%$ 氧吸入后观察。(3) 无自主呼吸和(或)心率 < 100 次/分时：应先面罩加压给氧 $15 \sim 30$ 秒。如有麻醉药物抑制，给纳洛酮后观察呼吸心率，再有呼吸抑制再次给药。如无麻醉药物抑制时，观察自主呼吸并评价心率，如心率 > 100 次/分，且出现自主呼吸时继续观察；如心率在 $60 \sim 100$ 次/分，且有增快趋势时，继续面罩加压给氧；如心率在 $60 \sim 100$ 次/分且无增快趋势，或心率 < 60 次/分时，行气管插管加压给氧，同时按压心脏 30 秒，如仍无好转则应用肾上腺素，必要时每 5 分钟重复一次，直至心率 > 100 次/分时，停止给药；有代谢性酸中毒时给碳酸氢钠，有出血、低血容量时给扩容剂，有持续休克时用多巴胺。 本文来源:百考试题网 扩容剂种类有：自身胎盘血、全血、血浆、 5% 人血白蛋白、生理盐水等。 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：
2010年儿科护理：新生儿窒息的治疗（重在原则） 2010年儿科护理：新生儿窒息的ABCDE复苏方案 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com