

2009年临床执业医师：淋菌性肛门直肠炎简介临床助理
执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_648600.htm 主要见于男性同性恋，占40%。
妇女则多由阴道自身感染所致，占35%~50%，直肠淋菌感染
症状可仅仅有肛门瘙痒，无痛性黏液样脓性分泌物，或少量
出血，也可表现有里急后重，有脓性便，肛管黏膜充血，脓
性分泌物，淋球菌培养阳性，男性同性恋多无临床症状，分
离出的淋球菌多为耐药菌株，这可能是由于某些高度敏感的
菌株迅速被大便中胆盐或脂肪酸杀死，这类淋球菌耐胆盐和
脂肪酸，染色体内常带有耐多种药物的耐药基因，治疗较困
难。百考试题论坛 人类是淋菌的唯一宿主。淋球菌对低等动
物无致病能力，曾多次将人体尿道内含有淋球菌的脓液移植
于兔子眼内，试图引起淋球菌结合膜炎，始终未获成功，说
明人类缺乏杀灭淋球菌的能力。所以淋球菌只能侵袭人类。
对于低等动物并无侵犯能力。更多信息请访问：百考试题医
师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com