

2010年外科辅导：大肠息肉应该如何治疗临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648675.htm

大肠息肉的处理原则是发现息肉即行摘除。目前摘除息肉的方法主要是内镜下行各种摘除法。根据息肉的形态、大小、数量及蒂的有无、长短粗细而分别采用：

- 高频电凝圈套切除法：主要用于有蒂息肉；
- 高频电凝灼除法：主要用于多发半球状小息肉；
- 高频电凝热活检钳法：目前很少应用，主要被圈套法取代；
- 活检钳除法：主要用于单发或少数球状小息肉，简便易行，又可取活组织病理检查；
- 激光气化法和微波透热法；适于无需留组织学标本者；
- 粘膜剥离嵌除法：主要用于扁平息肉或早期癌患者；
- “密接”摘除法，主要用于长蒂大息肉，难以悬于肠腔者采用大息肉密接肠壁电凝切除法。

分期批摘除法，主要用于10~20颗以上息肉患者无法一次切除者。内镜、外科手术联合治疗法，主要用于息肉病患者，即将息肉稀疏区以手术切除，这样即可达到治疗目的，又可维持大肠正常功能。来源：考试大 由于大肠息肉，特别是腺瘤性息肉已被学者公认为癌前期病变，所以，大肠息肉患者的定期随访已被提到防治早期大肠癌的高度来认识。大肠息肉，尤其腺瘤息肉、定期随访是防止息肉恶变的重要一环。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题 执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：大肠息肉应该做哪些检查 2010年外科辅导：大肠息肉有哪些表现及如何诊断 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com