

2010年外科辅导：骨折的功能复位标准临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648722.htm

经复位后，两骨折段虽未恢复至正常的解剖关系，但在骨折愈合后对肢体功能无明显影响者，称功能复位。但功能复位仍有一些必须遵守的标准：

骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正。来源：考试大

缩短移位：成人下肢骨折缩短移位不应超过1cm，上肢不应超过2cm。儿童处于生长发育期，下肢骨折缩短在2cm以内，若无骨骺损伤，可在生长发育过程中自行纠正。成角

移位：下肢骨折轻微地向前或向后成角，日后可在骨痂改造期内自行矫正。向侧方成角移位，日后不能矫正，必须完全复位。肱骨干稍有畸形，对功能影响不大；前臂双骨折则要求对位、对线均好，否则影响前臂旋转功能。

www.Examda.CoM

侧方移位：长骨干横形骨折，骨折端对位至少达1/3左右，干骺端骨折至少应对位3/4左右。更多信息请访问：

百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业

医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：骨折的固定方法

2010年外科辅导：骨折的功能锻炼 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com