

2010年口腔医师辅导：乳牙环状龋口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_648727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648727.htm)

乳前牙唇面、邻面龋较快发展成围绕牙冠的广泛性的环形龋，呈卷脱状。环状龋多现于牙冠中1/3至颈1/3处，有时切缘残留少许正常的釉质、牙本质。环状龋在恒牙中实为少见。有关乳牙环状龋这一特殊类型的表现，自Neuman于1897年报道以来，不少学者进行了研究。有学者认为与乳牙新生线之矿化薄弱有关。但有学者予以否定，并经病理组织学之观察分析，提示环状龋的形成与乳牙牙颈部出生后釉质之矿化度低有关。龋向两侧扩展，而不易向矿化度高、抗酸性强的出生前釉质扩展，以致形成环状。

环状龋之发生与局部食物易滞留及自洁作用较差亦有关。来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题口腔执业医师加入收藏相关推荐：2010年口腔医师辅导：乳牙奶瓶龋 2010年口腔医师辅导：乳牙龋蚀特点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)