

2010年口腔医师辅导：乳牙奶瓶龋口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648728.htm 奶瓶龋被称为milk bottle caries

、nursing bottle caries或bottle feeding caries.由于长时期用奶瓶人工喂养，瓶塞贴附于上颌乳前牙，而奶瓶内多为牛奶、砂糖、果汁等易产酸发酵的饮料，乳牙又是刚萌出不久，牙表面结构不成熟，更易受酸的作用而脱矿。又因用奶瓶人工喂养时，哺乳时的吸吮运动不如母乳喂养者活跃，且有的喜游玩似地长时间放在口中，唾液分泌减少，口腔自洁作用差，这些都是与奶瓶龋发生有关的因素。奶瓶龋主要发生于上颌乳前牙的唇面，且较快发展成广泛性龋。但奶瓶龋少见于下颌乳前牙，可能与吸吮时下颌、下唇的运动、瓶塞所附牙面的位置、近舌下腺和下颌下腺导管的开口等因素有关。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题口腔执业医师加入收藏相关推荐：2010年口腔医师辅导：乳牙易患龋因素 2010年口腔医师辅导：乳牙龋蚀特点 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com