

2010年口腔医师辅导：乳牙龋病的局部影响口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648733.htm 乳牙龋病对儿童口腔局部和机体都有不良的影响。（一）影响咀嚼功能 百考试题论坛 乳牙因龋蚀致牙体缺损，尤在涉及大部分乳磨牙时，咀嚼功能明显降低。（二）对恒牙及恒牙列的影响 乳牙的龋蚀、牙体的崩坏，使食物残渣、软垢等易停滞在口腔内，口腔卫生恶化，有利于新萌出的恒牙发生龋蚀。尤其对与龋牙相邻的恒牙影响较大。来源：考试大 乳牙龋发展成根尖周炎后，炎症影响后继恒牙牙胚，可使其釉质发育不全，如特纳牙的发生。乳牙根尖周炎致局部牙槽骨破坏、感染根管的牙根吸收异常、残根滞留等使后继恒牙的萌出过早或过迟，影响恒牙萌出顺序和位置。来源：考试大 牙冠因龋缺损，近远中径减少，或因龋早失，为后继恒牙所占间隙缩小。该恒牙萌出时因间隙不足而发生位置异常。（三）损伤口腔黏膜软组织 来源：考试大 破损的牙冠可刺激局部舌、唇颊的黏膜。慢性根尖周炎牙的根尖有时穿透龈黏膜外露于口腔内，使局部接触的软组织形成慢性创伤性溃疡。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题口腔执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com