

2010年外科辅导：结肠息肉50岁后易癌变临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648766.htm 家族性结肠息肉病很容易发生癌变，目前该院接诊的最小癌变患者只有16岁，而50岁以后的患者100%会癌变。一旦诊断为癌症，即使大肠全部切除，息肉也会转移到胃部、食道等，治疗效果不理想。专家介绍，结肠息肉病属于家族遗传性疾病。目前在临床接触的患者中，所患息肉数量从百十个到几千个不等，小的息肉也有黄豆大小，其组织结构和腺瘤一样，但在癌变前没有任何生命危险。来源：www.100test.com 息肉如果在结肠内长期受到各种刺激，非常容易发生癌变。其早期典型症状是腹泻，有的人会出现腹痛、贫血、体重减轻和排泄障碍等，如果仍未治疗还可能出现脓血便。特别是50岁以上的患者，如果突然出现腹泻、腹痛等不适症状，或是家族中有人曾得过此病，应尽早定期进行肠镜检查，以免错过治疗，等发现时病情已进展到中晚期。<http://ks.100test.com> 已确诊为家族性结肠息肉病的患者，在息肉不多的情况下可选择内镜下切除息肉，以保留大肠功能，而且患者术后的生活质量也不会有太大影响。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：结肠癌是由什么原因引起的 2010年外科辅导：结肠癌应该如何治疗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com