

2010年外科辅导：结肠癌是由什么原因引起的临床执业医师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A4\\_96\\_c22\\_648768.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648768.htm)

临床发现某些因素可能大大增加结肠癌发病的危险性，它们包括：1.发病年龄：大多数病人在50岁以后发病。来源：[www.100test.com](http://www.100test.com) 2.家族史：如果某人的一级亲属比如说父母得过结直肠癌的他在一生中患此病危险性比普通人群要高8倍大约四分之一的新发病人有结直肠癌的家族史。3.结肠疾病史：某些结肠疾病如克隆氏病或溃疡性结肠炎可能增加结直肠癌的发病机会他们结肠癌的危险性是常人的30倍。来源：考试大 4.息肉：大部分结直肠癌是从小的癌前病变发展而来它们被称为息肉其中绒毛样腺瘤样息肉更容易发展成癌恶变机会约为25%；管状腺瘤样息肉恶变率为1-5%。5.基因特征：一些家族性肿瘤综合症如遗传性非息肉病结肠癌可明显增加结直肠癌的发病机会而且发病时间更为年轻。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：结肠镜是诊断结肠癌的首选 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)