

2010年口腔助理辅导：药物性牙龈增生的临床表现口腔助理
执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_648807.htm 1.苯妥英钠所致的牙龈增生一般
开始于服药后的1~6个月内。 2.增生起始于唇颊侧或舌腭侧
龈乳头，呈小球状突起于牙龈表面。继之，增生的龈乳头继
续增大而互相靠近或相连并向龈缘扩展，盖住部分牙面，严
重时波及附着龈，使牙龈的外观发生明显的变化。龈乳头可
呈球状、结节状，增生的牙龈表面可呈桑葚状或呈分叶状，
增生的牙龈基底与正常牙龈之间可有明显的沟状界线。牙龈
增生严重者，甚至可覆盖大部或全部牙冠，严重妨碍进食，
也影响美观和口腔卫生。 3.增生的牙龈还可将牙齿挤压移位
，这种情况多见于上前牙。 百考试题论坛 4.药物性牙龈增生
的牙龈组织一般呈淡粉红色，质地坚韧，略有弹性，一般不
易出血。多数患者无自觉症状，无疼痛。由于牙龈增生肿大
，使龈沟加深，形成假性牙周袋，加之牙龈失去正常生理外
形，使菌斑易于堆积，也可合并有程度不同的牙龈炎症，此
时牙龈可呈深红或紫红色，质地较松软，牙龈边缘部分易于
出血。 百考试题(100test.com) 5.药物性牙龈增生常发生于全口
牙龈，但以上、下前牙区为重。它只发生于有牙区，拔牙后
，增生的牙龈组织可自行消退。 更多信息请访问：百考试题
医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏
相关推荐：2010年口腔助理辅导：药物性牙龈增生的病理
2010年口腔助理辅导：药物性牙龈增生的病因 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com