

2010年公卫医师辅导：地方性克汀病的诊断公卫执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_AC\\_c22\\_648820.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_648820.htm) 地方性克汀病的诊断标准如下。

1.必备条件 出生、居住在碘缺乏地区。 有精神发育不全，主要表现在不同程度的智力障碍。 来源：考试大 2.辅助条件 神经系统症状，不同程度的听力障碍、语言障碍和运动神经功能障碍。 甲状腺功能低下症状：不同程度的身体发育障碍；克汀病征象，如傻相、面宽、眼距宽、塌鼻梁、腹部隆起等；甲状腺功能低下表现，如出现粘液性水肿，皮肤、毛发干燥；X线骨龄落后和骨骺愈合延迟；血清T4降低，TSH升高。 百考试题论坛 有上述的必备条件，再具有辅助条件中神经系统症状或甲状腺功能低下症状任何一项或一项以上，即可诊断为地方性克汀病。 更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)