

2010年临床医师传染病学辅导：伪狂犬病症状临床执业医师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_648880.htm 本病是由伪狂犬病病毒引起的一种急性传染病，以奇痒和脑脊髓炎为特征。症状：潜伏期3~6天。病初，犬对周围事物表现淡漠，舐擦皮肤某一伤处，不安，拒食，卷缩，呕吐，随之痒觉增加，剧烈搔抓，不久形成烂斑，周围组织肿胀，甚至破损。个别病犬有攻击行为，狂叫不安，流涎，吞咽困难。大部分病犬头颈部肌肉和口唇部肌肉痉挛，呼吸困难，常于36小时内死亡。致死率100%。www.Examda.CoM 防治：尚无特效疗法。早期应用抗伪狂犬病病毒的高免血清可取得一定疗效。防止继发感染，可用磺胺类药物。有疫情流行趋势应立即采取ELISA试剂盒进行监测。预防上应加强灭鼠，禁止饲喂病猪肉，对病犬粪便和尿液要随时冲刷清理，对犬舍及清除的粪使用0.1%烧碱进行消毒处理。百考试题(100test.com) 公共卫生伪狂犬病对人有一定危害，在欧洲曾有人感染伪狂犬病病毒报道。患者感觉皮肤剧痒，通常不引起死亡。一般经皮肤创伤感染，因此，处理病犬时要注意自身保护。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com