

2010年妇产科学辅导：决定分娩的因素胎儿临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A6_87_c22_648921.htm

胎儿能否顺利通过产道取决于胎儿大小、胎位及胎儿是否畸形。（一）胎儿大小在分娩过程中，胎儿大小是决定分娩难易的重要因素之一。胎头是胎体的最大部分，也是胎儿通过产道最困难的部分。www.

Examda.CoM 1.胎头颅骨的构成：由两块顶骨、额骨、颞骨及一块枕骨构成。矢状缝和囟门是确定胎位的重要标志。在临产过程中，通过颅缝轻度重叠使头颅变形，缩小头颅体积，有利于胎头的娩出。2.胎头主要径线及其平均值：双顶径：是胎头的最大横径，为两顶骨隆突间的距离，临床用B型超声判断胎头大小，妊娠足月时平均值约为9.3cm。枕额径：又称前后径，胎头以此径衔接，妊娠足月时平均值约为11.3cm。枕下前凶径：又称小斜径，胎头俯屈后以此径通过产道，妊娠足月时平均值约为9.5cm。枕颞径：又称大斜径，妊娠足月时平均值约为12.5cm。（二）胎位来源:百考试题

网 纵产式、头位头先露时胎头先通过产道，触清矢状缝及前后凶，即能确定胎位，较臀位容易娩出。臀位时，胎臀先娩出，使胎头娩出困难。如果横产式肩先露时，妊娠足月的活胎不能通过产道，对母儿危险极大。（三）胎儿畸形 胎儿先天畸形，如脑积水、连体儿等，通过产道常发生困难。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com