

2010年临床助理辅导：手术后病人的卧位的特点临床助理执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_648924.htm 手术后病人的卧位的特点：

(1) 全麻未清醒，平卧、头偏向一侧；来源：www.examda.com
(2) 蛛网膜下腔麻醉后，平卧或头低位12小时；(3) 硬膜外麻醉及局麻病人，可根据需要安置卧位。来源

：www.examda.com 头颅手术后，如无昏迷，可取 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 头高脚低斜坡位；防止脑水肿 颈胸手术后多采取高坡卧位；膈肌下移使呼吸通畅 腹部手术后多取低半坐位；降低刀口处张力 来源：www.examda.com 脊柱或臀部手术后，可采取俯卧或仰卧位。

休克病人，应取平卧位或下肢（床脚）抬高 20° ，头部和躯干同时抬高 5° 左右的体位。有利于血液回流到重要器官 相关推荐：2010年临床助理辅导：手术后病人的活动和起床 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com