

2011年中药剂学知识点：水毛射 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_648105.htm 讲述了水毛射的拼音名，别名

，来源，原形态，生境分布，性状，性味，功能主治，用法用量。【拼音名】Shu Máo Shè 【别名】毛水珍珠草、毛射草、蛇尾草、牛触臭、狐狸尾、狗仔尾、水凉粉草、毛鼠尾、老鼠癩【来源】药材基源：为唇形科植物水珍珠菜的全草。拉丁植物动物矿物名：Pogostemon auricularius (L.

) Hassk.[*Mentha auricularis* L. ; *Dysophylla auricularis* (L.) Bl.]
采收和储藏：夏、秋季采刷，洗净，鲜用或晒干。【原形态】水珍珠菜，一年生草本，高0.4-2m.茎基部平卧，节上生根，上部上升，四棱形，密被黄色平展长硬毛。叶对生；叶柄短，密被黄色糙硬毛；上部叶近无柄；叶片长圆形或卵状长圆形，长2.5-7cm，宽1.5-2.5cm，先端钝或急尖，基部圆或浅心形，边缘具锯齿，两面被黄色糙硬毛，下面具腺点。轮伞花序多花，通常在茎或枝顶组成紧密而连续、有时基部间断的假穗状花序，长6-18cm；苞片卵状披针形，常与花冠等长，边缘具糙硬毛；花萼钟状，长约1mm，仅萼齿边缘具疏柔毛，其余部分无毛，但具小腺点，萼齿5，短三角形，长约为萼筒1/4；花冠淡紫或白色，长约为花萼长度的2.5倍，无毛，上唇3裂，下唇全缘，裂片边缘具柔毛；雄蕊4，长长地伸出，伸出部分具髯毛；子房4裂，花柱比雄蕊短，柱头2裂；花盘杯状。小坚果近球形，褐色。花期4-11月，果期5-12月。

【生境分布】生态环境：生于海拔300-1700m的疏林下湿润处或溪边近水潮湿处。资源分布：分布于江西、福建、台湾、

广东、广西及云南等地。【化学成份】全草含耳草酸 (auricularic acid)，7-羟基闭花木-13，15-二烯-18-羧酸 (7-hydroxycleistanth-13，15-dien-18-oic acid)，7-乙酰氧基闭花木-13，15-二烯-18-羧酸 (7-acetoxycleistanth-13，15-dien-18-oic acid)。地上部分含7-(3-甲基丁酰氧基)闭花木-13，15-二烯-18-羧酸[7-(3-methylbutyroxy)cleistanth-13，15-dien-18-oic acid]，7-千里光酰氧基闭花木-13，15-二烯-18-羧酸 (7-senecioxycleistanth-13，15-dien-18-oic acid)。

【性味】味微苦、辛；性凉【功能主治】散风清热；祛湿解毒；消肿止痛。主治感冒发热；惊风；风湿痛；肠伤寒；疝气；疮肿湿烂；湿疹；小儿胎毒；毒蛇咬伤。【用法用量】内服：煎汤，10-30g.外用：适量，捣敷；或取汁涂；或煎水洗。【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学知识点：鲨鱼油 #0000ff>2011年中药剂学知识点：水毛花 知识点复习技巧： #0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐：#0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com