

2011年中药剂学知识点：水枇杷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_648108.htm 讲述了水枇杷的拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，性状，性味，功能主治，用法用量。【出处】出自《广西中草药》。【拼音名】Shu P í P á 【英文名】Root of Common Saurauia 【别名】水牛奶、红毛树、米花树、鼻涕果。【来源】药材基源：为猕猴桃科植物水东哥的根或叶。拉丁植物动物矿物名：Saurauia tristyla D C.采收和储藏：根，全年均可采，叶，春、秋季采，晒干或鲜用。【原形态】水东哥 灌木或小乔木，高3-6m.小枝淡红色，粗壮，被爪甲状鳞片或钻状刺毛。单叶互生；叶柄长1.5-4cm，具钻状刺毛，稀有绒毛或无；叶片倒卵状椭圆形，稀阔椭圆形，长10-28cm，宽4-11cm，先端短渐尖，偶有尖头，基部阔楔形，稀钝，边喙具刺状锯齿，侧脉10-26对，两面中、侧脉具钻状刺毛或爪甲状鳞片，腹面侧脉间具1行稀2-3行偃伏刺毛。聚伞花序通常具3花，单生或簇生于叶腋或老枝的叶痕腋部，被绒毛和钻状刺毛，分枝处有苞片2-3枚；苞片卵形，长1-1.5mm，被绒毛；萼片5，卵形，长3-4mm；花瓣5，粉红色或白色，基部合生，长约8mm，顶部向外反折；雄蕊多数，花药顶孔开裂；子房卵形，无毛，花柱3-4，稀5，中部以下合生。浆果球形，白色、绿色或淡黄色，直径6-10mm.花期6-9月，果期12月至次年2月。【生境分布】生态环境：生于丘陵和山地林缘及灌丛中。资源分布：分布福建、广东、广西、四川、贵州、云南等地。【性状】性状鉴别 完整叶倒卵状椭圆形，稀阔椭圆形，长10-28cm，宽4-11cm

，先端短渐尖，基部阔楔形，叶缘具刺状锯齿；侧脉10-26对，下面侧脉间具1(-3)行偃伏刺毛；叶柄长1.5-4cm.气微，味苦、凉。以叶片少破碎者为佳。【性味】微苦；凉【归经】肺经【功能主治】疏风清热；止咳；止痛。主治风湿咳嗽；风火牙痛；麻疹发热；尿路感染；白浊；白带；疮疖肿痛；骨髓炎；烫伤。【用法用量】内服：根煎汤，10-15g.外用：叶适量，研末，香油调或制成药膏搽。【各家论述】1.《广西中草药》：清热解毒，止咳，止痛。治风热咳嗽，风火牙痛。2.《广西药植名录》：治小儿麻疹，风湿冷痛。【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学知识点：水木草 #0000ff>2011年中药剂学知识点：水棉花 知识点复习技巧：#0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐：#0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com