

2012年执业药师中药剂学知识点：拔毒散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648412.htm 讲述了拔毒散的出处，别名，来源，原形态，生境分布，性味，归经，功能主治，用法用量，注意，各家论述，摘录。【出处】出自《滇南本草》。

【别名】王不留行、小尼马庄柯、巴掌叶、小拔毒、尼马庄柯、妈妈多、肯麻头、小迷马桩、白背黄花稔、小黄药、迷马桩棵、小克麻、小路边站。【来源】药材基源：为锦葵科植物拔毒散的枝叶。拉丁植物动物矿物名

：*Sidaszechuensis*Matsuda采收和储藏：秋季采收，鲜用或晒干。【原形态】拔毒散直立亚灌木，高约1m.小枝被星状长柔毛。叶二型；叶柄长5-10mm，被星状柔毛；托叶钻形，较短于叶柄；下部的叶宽菱形至扇形，长2.5-5cm，宽近似，先端短尖至浑圆，基部楔形，边缘具2齿，上部的叶长圆状椭圆形至长圆形，长2-3cm，两端钝至浑圆，上面疏被星状毛或糙伏毛至几无毛，下面密被灰色星状毡毛。花单生或簇生于小枝端，花梗长约1cm，密被星状粘毛，中部以上具节；萼杯状，长约7mm，裂片三角形，疏被星状柔毛；花黄色，直径1-1.5cm，花瓣倒卵形，长约8mm；雄蕊往长约5mm，被长硬毛。果近圆球形，直径约6mm，分果片8-9，疏被星状柔毛，具短芒。种子黑褐色，平滑，长2mm，种脐被白色柔毛。花期6-11月。【生境分布】生态环境：生于荒坡灌丛、松林边、路旁和沟谷边。资源分布：分布于西南及广西等地。【性味】苦；寒【归经】肺；肝经【功能主治】下乳；活血；利湿；解毒。主乳汁不下；乳痈；痈肿；小便淋涩；泄泻；

痢疾；闭经；跌打骨折【用法用量】内服：煎汤，9-15g.外用：适量，捣敷。【注意】孕妇禁服。【各家论述】1.《滇南本草》：治妇人乳汁不通，乳痈、乳结、红肿，消诸疮肿毒；治小儿尿血，血淋，祛皮肤瘙痒，消风解热。梗叶细末，醋调敷痈疽疮毒溃散。2.《云南中草药》：活血祛瘀，拔毒，接骨，通乳。治经闭，疔疮，枪伤，骨折。3.《云南中草药选》：消炎，拔毒生肌。治急性乳腺炎，急性扁桃体炎，肠炎，菌痢。【摘录】《中华本草》相关推荐：[移毒散](#)[会毒散](#) 特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#)[报名条件](#)[考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com