

2012年执业药师药理学知识点：氨基己酸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_648441.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648441.htm) 讲述了氨基己酸的俗称，类别，适应症，用量用法，注意事项。俗称：6-氨基己酸；ε-氨基己酸；氨基己酸；抗血纤溶酸，氨己酸 类别：促凝血药「适应症」用于纤溶性出血，如脑、肺、子宫、前列腺、肾上腺、甲状腺等外伤或手术出血。术中早期用药或术前用药，可减少手术中渗血，并减少输血量。「用量用法」1.静滴：初用量4~6g，以5%~10%葡萄糖或等渗盐水100ml稀释，15~30分钟内滴完，维持量为每小时1g，维持时间依病情而定，1日量不超过20g，可连用3~4日。2.口服：成人每次2g，小儿每千克体重0.1g，1日3或4次，依病情服用7~10日或更久。「注意事项」1.偶有腹泻、腹部不适、结膜充血、鼻塞、皮疹、低血压、呕吐、胃灼热感及尿多等反应。2.本品排泄较快，需持续给药，否则血药浓度迅速降低。3.本品不能阻止小动脉出血，术中如有活动性动脉出血，仍需结扎止血。4.本品从肾脏排泄，且能抑制尿激酶，可引起血凝块而形成尿路阻塞，故泌尿道手术后，血尿的病人慎用。5.有血栓形成倾向或过去有栓塞性血管病者慎用。 相关推荐：[氯化氨基汞](#) [对氨基苯甲酸酯类](#) 特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#) [报名条件](#) [考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)