

2012年执业药师药理学知识点：利托君 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648443.htm 讲述了利托君的俗称，类别，适应症，用量用法，注意事项。俗称：利妥特灵，幼托，羟苄麻黄碱，利托君，雷托君，柔托扒 类别：生殖系统药/抗早产药 「适应症」 为 β_2 肾上腺素受体激动剂，可激动子宫平滑肌中的 β_2 受体，抑制子宫平滑肌的收缩，减少子宫的活动而延长妊娠期。 「用量用法」 1.静滴：取本品150mg用500ml静滴溶液稀释为每毫升0.3mg的溶液，于48小时内使用完毕。静滴时，应保持左侧姿势，以减少低血压危险。开始时，应控制滴速使剂量为每分钟0.1mg，并逐渐增加至有效剂量，通常保持在每分钟0.15~0.35mg之间，待宫缩停止后，至少持续输注12小时。 2.口服：本品10mg（1片）。头24小时内通常口服剂量为每2小时10mg，此后每4~6小时10~20mg，每日总剂量不超过120mg。为了抗早产的需要，此种维持治疗还可按此剂量继续口服 「注意事项」 1.本品禁用于妊娠不足20周和分娩进行期（子宫颈扩展大于4cm或开全80%以上）的孕妇。 2.本品对 β_2 受体的激动作用选择性不强，它同时也作用于 β_1 受体，故可发生心悸、胸闷、胸疼和心律失常等反应，反应严重者应中断治疗。有严重心血管疾病的病人禁用。 3.本品可以升高血糖及降低血钾，故糖尿病病人及使用排钾利尿剂的病人慎用。本品能通过胎盘屏障使新生儿心率改变和出现低血糖，应密切注意。 4.静脉注射时，还可有震颤、恶心、呕吐、头痛和红斑以及神经过敏、心烦意乱、焦虑不适等不良反应。口服还可有心率增加、心悸

和震颤、恶心和颤抖、皮疹和心律失常等反应。5.与糖皮质激素合用，可出现肺水肿，极严重者可导致死亡。6.溶液变色或出现沉淀或结晶，则不可再用。相关推荐：[利血平](#) [托利洛尔](#) 特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#) [报名条件](#) [考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com