

2012年执业药师药理学知识点：平阳霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648445.htm 讲述了平阳霉素的俗称，类别，适应症，用量用法，注意事项。俗称：平阳霉素，争光霉素a5 类别：抗肿瘤抗生素 「适应症」 对头颈部鳞癌、恶性淋巴瘤有显著疗效，对乳腺癌、宫颈癌、食管癌、鼻咽癌等也有效，对肺癌有一定的缓解作用。「用量用法」 肌注、静注、肿瘤内注射或动脉插管给药，使用前用等渗盐水溶解，静注、动脉插管给药时，亦可用5%葡萄糖液溶解，每次10mg，每周2~3次，1疗程总量200~300mg（显示疗效剂量一般为100~200mg）。「注意事项」 1.可有发热、胃肠道反应、皮肤反应（色素沉着、角化增厚、皮炎、皮疹等）、脱发、肢端麻痛、口腔炎、肺炎样变或肺纤维化等。用药期间应进行肺检查，如出现肺炎样变应立即停药，并给以泼尼松或地塞米松，对年老体弱有肺部疾患病人慎用。其他反应经对症处理或停药，一般均可缓解或消失。 2.为防止高热反应，可从小剂量（如2mg，4mg）开始，逐渐增至常规量。用药前后给予消炎痛或泼尼松，可减轻发热反应。相关推荐：[#0000ff>抗生素类抗肿瘤药平阳霉素](#) [#0000ff>烷化剂抗肿瘤药盐酸平阳霉素](#) 特别推荐：[blue>2012年执业药师考试时间](#) [blue>报名条件](#) [blue>考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com