

2012年执业药师药理学知识点：野火绳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_648483.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648483.htm) 讲述了野火绳的拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，性味，功能主治，用法用量，摘录。【拼音名】Yé Hu Shén【别名】子金根、小白药、小火绳、澜沧扁担杆。【来源】药材基源：为椴树科植物毛果扁担杆的根白皮。拉丁植物动物矿物名：Grewia eriocarpa Juss. [ G.lantsangensis Hu ] 采收和储藏：秋、冬季挖取根部，剥取根皮，除去栓皮，切段，鲜用或晒干。【原形态】毛果扁担杆 灌木或小乔木，高达8m.嫩枝被灰褐色星状软茸毛。叶互生；叶柄长5-10mm；托叶线状披针形，长5-10mm；叶片纸质，斜卵形至卵状长圆形，长6-13cm，宽3-6cm，先端渐尖或急尖，基部偏斜，斜圆形或斜截形，上面散生星状毛，干后变黑褐色，下面被灰色星状软茸毛，边缘有细锯齿；三出脉的两侧脉上升达叶长的3/4，中脉上半部有侧脉3-4对。聚伞花序1-3枝腋生，长1.5-3cm，花序柄长3-8mm；花柄长3-5mm；苞片披针形；花两性；萼片狭长圆形，长6-8mm，内外两面均无毛；花瓣长3mm；腺体短小；雌雄蕊柄被毛；雄蕊离生，长短不一，比萼片短；子房被毛，花柱有短柔毛，柱头盾形，4浅裂或不分裂。核果近球形，直径6-8mm，被星状毛，有浅沟。【生境分布】生态环境：生于半山坡草丛和疏林中。资源分布：分布于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南等地。【性味】涩；微苦；凉【功能主治】止血；接骨；生肌；解毒。主治外伤出血；刀枪损伤；骨折；疮疖红肿。【用法用量】外用：适量，鲜品捣

敷；或研末调敷。 相关推荐：[野酒花](#)[八股绳](#)  
特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#)[报名条件](#)  
[考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)