

2012年执业药师药理学知识点：亚甲蓝 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648501.htm 讲述了亚甲蓝的俗称，类别，适应症，用量用法，注意事项。 俗称：次甲蓝；美兰；美蓝，亚甲蓝 类别：解毒药 「适应症」 治疗尿路结石，闭塞性脉管炎、神经性皮炎及口腔溃疡。还试用于有亚硝酸盐及苯胺类，氰化物引起的中毒。「用量用法」 1.治疗尿路结石：每次服65m g，1日3次，1日量可用至300m g，疗程1年半以上。治疗期避免高钙食物，多饮水，保持尿液稀释。 2.治疗闭塞性脉管炎：用本品动脉注射，每隔3，4日1次，用量为0.5%5~10m l，3次为1疗程。 3.治疗神经性皮炎：本品与神经组织有较强的亲和力。用0.2%溶液局部注射，可作用于神经末梢，损害末梢神经髓质，新生的髓质大约于30日后修复完毕。治神经性皮炎时，用本品复方溶液（由本品0.2 g，盐酸普鲁卡因3 g，加水至100m l而成）局部多处点状注射，1次用药总量不超过15m l。在注射后多有疼痛，经4小时左右疼痛逐渐转为麻木，此时因末梢神经受刺激，继而神经髓质受损，约30日后，新的髓质生长，感觉可恢复正常。少数病人可以复发，但皮损程度较前大为减轻。 4.本品亦可外用于口腔溃疡的涂布。 5.治疗亚硝酸盐（包括烂白菜及渍不好的蔬菜、酸菜等）及苯胺类引起的中毒，用1%溶液5~10m l，稀释于25%葡萄糖溶液20~40m l，静注或口服本品150~250 m g，每4小时1次。 6.治疗氰化物中毒：用1%溶液50~100m l静注，再注入硫代硫酸钠。二者交替使用 「注意事项」 1.不可作皮下、肌肉或鞘内注射，以免造成损害。 2.静脉注射

剂量过大（500m g）时，可引起恶心、腹痛、心前区痛、眩晕、头痛、出汗和神志不清等不良反应。相关推荐：
#0000ff>亚硝酸异戊酯 #0000ff>硫酸亚铁 特别推荐：[blue>2012年执业药师考试时间](#) [blue>报名条件](#) [blue>考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com