

2012年执业药师药理学知识点：三嗪咪唑胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_648507.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648507.htm) 讲述了三嗪咪唑胺的药品名，英文名，别名，作用与用途，药理作用，用法与用量，注意事项，制剂。 [药品名]三嗪咪唑胺 [英文名]Dacarbazine [别名]甲嗪咪唑胺、甲氮咪胺、氮烯咪胺、DIC、DTIC、DTICDome、 [分子式] $C_6H_{10}ON_6$  [性状]为白色至象牙色粉末；遇热分解，对酸和光不稳定。 [作用与用途]对多种动物肿瘤有抑制作用。本品作用于细胞周期的G<sub>2</sub>期，阻断核酸和嘌呤核甙酸的合成，对RNA和蛋白质合成的影响比对DNA大。主要用于恶性黑色素瘤，比经基脲效果好，如与醛基长春碱、卡氮芥合用可提高疗效。对肺鳞癌和未分化癌、平滑肌肉瘤、纤维肉瘤等也有一定效果，对消化道肿瘤疗效不佳。 [用法与用量]静注或静滴：每日2.56mg / kg，或0.2-0.4g / m<sup>2</sup>（体表面积），用灭菌注射用水1020mg溶解缓慢推注，连用510日为1疗程。 [注意事项] 1.注射剂用灭菌注射用水溶解后，在棕色容器内可存13天，最好临用时新鲜配制。 2.用药期间应定期做血象及肝、肾功能检查。 3.骨髓抑制主要表现为白细胞及血小板减少，部分病人可出现贫血，尤其大剂量时对骨髓毒性更为明显；胃肠道反应有恶心、呕吐或腹泻；对局部有刺激性，可引起注射部位血管疼痛；部分病人有类似“流感”症状的反应，如全身不适、高热、肌肉疼痛以及肝、肾功能损害等。 [贮藏]避光，在2 -8 保存，粉针剂于-4可保存2月。 [制剂]注射剂：每支0.2g（枸橼酸盐） 相关推荐：  
： #0000ff>阿司咪唑 #0000ff>甲巯咪唑 特别推荐： blue>2012

年执业药师考试时间 blue>报名条件 blue>考试科目 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)