

2012年执业药师中药剂学知识点：伞杨 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c23\\_648518.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_648518.htm) 讲述了伞杨的拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，性味，性状，功能主治，用法用量，注意，附方。【拼音名】Sǎn Yáng【别名】截萼黄槿、恒春黄槿。【来源】药材基源：为锦葵科植物桐棉的全株。拉丁植物动物矿物名：Thespesia populnea (L.) Soland.ex Corr.[Hibiscus poulneus L.] 采收和储藏：秋、冬季采，洗净，鲜用或晒干。【原形态】桐棉常绿乔木，高约6m.小枝具褐色盾形细鳞秕。叶互生；叶柄长4-10cm，具鳞秕；托叶线状披针形，长约7mm；叶片卵状心形，长7-18cm，宽4.5-11cm，先端长尾状，基部心形，全缘，上面无毛，下面被稀疏鳞秕。花单生于叶腋间；花梗长2.5-6cm，密被鳞秕；小苞片3-4，线状披针形，被鳞秕，长8-10mm，常早落；花萼杯状，截形，直径约15mm，具5尖齿，密被鳞秕，花冠钟形，黄色，内面基部具紫色块，长约5cm；雄蕊柱长约25mm；花柱棒状，先端具5槽纹。蒴果梨形，直径约5cm.种子三角状卵形，长约9mm，被褐色纤毛，间有脉纹。花期近全年。【生境分布】生态环境：常生于海边和海岸向阳处。资源分布：分布于台湾、广东、海南等地。【化学成份】叶含羽扇豆醇(lupeol)，-谷甾醇(-sito-sterol)，C19-C33烷烃(C19-C33 alkanes)，羽扇烯酮(lupenone)，伞杨还含棉酚(gossypol)。【性味】苦；寒【功能主治】清热解毒；消肿止痛。主治脑膜炎；痢疾；痔疮；睾丸肿痛；疥癣。【用法用量】内服：煎汤，3-10g.外用：适量，

捣敷。【摘录】《中华本草》相关推荐：[伞莎草](#)  
[伞形梅笠草](#) 特别推荐：[2012年执业药师考试时间](#)  
[报名条件](#) [考试科目](#) 100Test 下载频道开通，各类  
考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)