

全国2008年7月高等教育自学考试老年护理学试题自考 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD2008_c67_648725.htm 全国2008年7月高等教育自学考试

老年护理学试题 课程代码：04435一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 根据特定的国情和传统文化，我国主要的养老模式应为（ ）
A. 居家养老 B. 老年公寓养老 C. 养老院养老 D. 日间护理院养老
2. 适宜老年人使用的床的高度为从床褥上面距地面的高度，是（ ）
A. 45 cm B. 50 cm C. 55 cm D. 60 cm
3. 老年人发生中暑后，纠正病人失水时，应使其尿量保持在（ ）
A. 30 ml/h 以上 B. 40 ml/h 以上 C. 50 ml/h 以上 D. 60 ml/h 以上
4. 老年人应用经肝脏代谢的药物时，其剂量一般为青年人应用剂量的（ ）
A. $1/3 \sim 1/4$ B. $1/2 \sim 1/3$ C. $2/3 \sim 1/3$ D. $3/4 \sim 1/4$
5. 流行性感感冒的潜伏期为（ ）
A. 1~3天 B. 3~5天 C. 5~7天 D. 2周
6. 在人的各种感觉中，老化最明显的是（ ）
A. 痛觉 B. 味觉 C. 视听觉 D. 触觉
7. 为患有支气管哮喘的老人进行氧疗时，吸氧流量为（ ）
A. 1~3 L/min B. 2~4 L/min C. 3~5 L/min D. 4~6 L/min
8. 心血管专科最常用的，有助于各种心律失常和急性心肌梗死的确诊的检查项目是（ ）
A. 心肌坏死标记物检查 B. 选择性心血管造影术 C. 超声心动图 D. 常规心电图
9. 促使老年心衰病人病情变化、甚至猝死或难以有效控制的最常见诱因是（ ）
A. 心律失常 B. 水电解质紊乱及酸碱失衡 C. 感染 D. 输液过多过快
10. 老年冠心病最主要的独立危险因

素是 () A . 血脂异常 B . 糖尿病 C . 吸烟 D . 高血压 11 . 老年消化性溃疡最常见的并发症是 () A . 出血 B . 穿孔 C . 幽门梗阻 D . 癌变 12 . 以腹部按摩缓解老年人便秘时 , 按摩的顺序为 () A . 右下腹 右上腹 左上腹 左下腹 B . 右上腹 右下腹 左下腹 左上腹 C . 左下腹 左上腹 右上腹 右下腹 D . 左上腹 右上腹 右下腹 左下腹 13 . 为老人进行尿常规检查时 , 留取的尿标本应及时送检 , 一般尿标本从排出到试验应限定在 () A . 0.5小时以内 B . 1小时以内 C . 1.5小时以内 D . 2小时以内 14 . 最常见的老年贫血临床类型是 () A . 缺铁性贫血 B . 巨幼细胞贫血 C . 慢性病性贫血 D . 再生障碍性贫血 15 . 一位68岁男性 , 身高165厘米 , 患有糖尿病的老人 , 按理想体重计算 , 其每日饮食中蛋白质含量应为 () A . 26~39 g B . 39~52 g C . 52~65 g D . 52~78 g 16 . 中国人听力老化的转折期是 () A . 40~49岁 B . 50~59岁 C . 60~69岁 D . 70~79岁 17 . 一位65岁女性老人 , 行人工髌关节置换术 , 护士指导其术后在不负重情况下扶拐练习行走。练习开始时间应为 () A . 术后第3天 B . 术后1周 C . 术后2~4周 D . 术后4~6周 18 . 夜班护士在接班时 , 发现一位脑出血的老人骶尾部皮肤红肿 , 皮肤表面有散在的水疱 , 表明该病人的压疮处于 () A . Ⅰ期 B . Ⅱ期 C . Ⅲ期 D . Ⅳ期 19 . 患有短暂性脑缺血发作的老人 , 其眼动脉缺血的特征性症状是 () A . 雾视 B . 视野中有黑点 C . 一过性单眼盲 D . 双侧视力障碍 20 . 临终病人表现出怨天尤人 , 责怪命运不公 , 迁怒他人。根据美国精神病学家伯乐罗斯博士的临终病人心理分期 , 该种表现属于 () A . 否认阶段 B . 愤怒阶段 C . 协议阶段 D . 抑郁阶段 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com