

2010年临床医师辅导：葡萄胎的临床特点临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_649179.htm

葡萄胎的临床表现：来源：考试大
1.停经后阴道流血一般在停经8~12周出现，部分患者在阴道流血之前可出现阵发性下腹痛。
2.子宫异常增大、变软约有1/3完全性葡萄胎患者子宫大于停经月份，并伴有血清HCG水平异常升高。
3.妊娠呕吐较正常妊娠发生早，症状重，持续时间长。来源:百考试题网
4.子痫前期子痫征象可在妊娠20周前出现高血压、水肿和蛋白尿，并且症状严重。百考试题论坛
5.卵巢黄素化囊肿常为双侧，若发生扭转或破裂，可出现急性腹痛，葡萄胎清除后可自行消退。
6.腹痛葡萄胎生长迅速使子宫过度扩张所致，表现为下腹阵痛。若发生黄素囊肿扭转或破裂，可出现急性腹痛。
7.甲状腺功能亢进征象约7%的患者可出现轻度甲状腺功能亢进表现。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com