

2010年临床医师辅导：肠结核的概述临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_649246.htm

肠结核是结核杆菌侵犯肠道所引起的慢性肠道结核病，多发生于青少年及壮年，女性略多于男性。肠结核主要原因患有咽下肺部咯出的含大量结核杆菌的痰液或较长时间进食被结核杆菌污染的食物，或经常与开放性肺结核患者共餐，使结核杆菌直接进入肠道所致。少数可由体内结核病灶经血行和直接蔓延至肠道。肠结核起端正缓慢、病程长。其表现有：（1）腹痛来源：www.examda.com 多位于右下腹、其次是脐周和整个下腹部，常为隐痛或钝痛，多于进食后发生，排便后缓解。

（2）大便习惯改变来源：www.100test.com 常有腹泻，多呈稀糊状或水样，每天3~6次；重者腹泻黏液脓便，每天可达十几次；部分患者每于晨间排稀便称鸡鸣泻，且常伴有呕吐和肠绞痛；有的患者腹泻与便秘交替出现。（3）结核毒性症状主要有午后低热、盗汗、乏力、食欲不振、消瘦、贫血和虚弱等。来源：www.examda.com（4）X线钡剂灌肠和纤维结肠镜检查有助于本病诊断。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com