

2010年临床助理辅导：类癌应该做哪些检查临床助理执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/649/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_649269.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_649269.htm)

(一) 5-HT测定 类癌综合征患者血清5-HT含量常明显升高，多为83 ~ 510  $\mu\text{mol}/24\text{h}$  (正常为11 ~ 51  $\mu\text{mol}/24\text{h}$ )。来源：考试大 (二) 5-HIAA测定 类癌综合征患者尿中5-HIAA排出增多，往往超过78.5  $\mu\text{mol}/24\text{h}$ ，一般在156.9 ~ 3138  $\mu\text{mol}/24\text{h}$  (正常值 < 47.1  $\mu\text{mol}/24\text{h}$ )。

(三) 皮肤潮红激发试验 将10ml乙醇加入15ml桔子汁中口服，3 ~ 5分钟后，约1/3患者出现皮肤潮红。静脉注射去甲肾上腺素15 ~ 20  $\mu\text{g}$ ，肾上腺素5 ~ 10  $\mu\text{g}$ 。此二种激发试验对诊断有一定帮助。但有心律失常、心功能不全哮喘史应慎重。

更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)