

2010年妇产科学辅导：畸胎瘤的护理临床执业医师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A6_87_c22_649324.htm 手术前、后合理饮食的重要性及注意事项：1、术前1天半流质饮食，术日晨禁饮食，防麻醉误吸。百考试题论坛 2、术后禁食6小时，之后流质饮食，禁糖、奶，排气后由半流质饮食逐渐改为普通饭。3、术前准备的必要性和必要性：备皮以清洁皮肤、预防切口感染。术前用药目的保证睡眠、诱导麻醉，增强麻醉效果，减少腺体分泌。胃肠道准备防止术中、术后呕吐物误吸，防止术中误伤肠管，有利于手术顺利进行，防止术后腹胀。4、置尿管利于手术，预防误伤膀胱。5、术前备血及药物过敏试验为术中、术后输血、用药做准备。www.Examda.CoM 6、手术后可能感觉全身不适、头晕、切口疼痛，属正常现象，必要时用止痛剂。亦可有恶心、呕吐，多因麻醉药物及手术刺激所致。7、教病人手术后翻身的技巧、减轻腹部张力的方法、咳嗽时防止切口疼痛的技巧、下床技巧、床上使用便器等。8、术后去枕平卧、头偏向一侧防止头痛、防止呕吐物误吸引起窒息、预防休克。来源:百考试题网 9、拔除尿管、早小便有利于膀胱功能的恢复，预防尿潴留；避免因膀胱过度充盈排尿困难。10、出院指导：（1）子宫全切术后休息1个月，2-3个月内禁止性生活。避免疲劳，肌瘤剔除术后，禁盆浴及性生活1个月。来源：www.100test.com（2）子宫全切术后7-14天，阴道内有少量粉红色分泌物，为阴道残端肠线溶化所致，属正常现象，不需处理，适当休息即可，若分泌物呈血性，量如月经，应及时就诊。（3）伤口拆线后1周可淋

浴，平日用温水擦洗预防感冒。更多信息请访问：百考试题
医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com