

2010年医师内科辅导：甲状腺癌早期症状临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_649448.htm

甲状腺癌是甲状腺上皮组织的恶性肿瘤，如不尽早发现，它将是埋在颈部的，颗定时炸弹，会危害病人的生命。哈尔滨医科大学附属二医院的调查资料显示，1971-1991年全哈尔滨市六家医院共接收204例甲状腺癌病人，病程平均为2.5年，一般都就诊较晚。百考试题(100test.com)

甲状腺癌早期症状有：儿童和40岁以上的女性是多发者，男女之比为1：2.4.早期缺乏特征性临床表现，但95%以上的病人均有颈前肿块（或肿物），尤其是孤立的、不规则的、境界不清楚的、活动性欠佳的硬性肿物，应特别予以警惕。来源：www.100test.com

除了肿物外还有下列症状：病人声音嘶哑或饮水时呛咳；呼吸困难或吞咽困难；耳、枕、肩部有放射性疼痛；颈部静脉受压扩张或出现眼裂、瞳孔缩小；同侧或双侧淋巴结肿大等。凡出现上述症状者，更应该高度怀疑甲状腺癌的可能。作针吸细胞学检查。

此法为甲状腺癌最可靠的诊断方法之一，其正确率达到80%以上；术中快速冰冻切片检查是甲状腺癌的关键性诊断手段，其正确串近90%；石蜡切片病理检查为甲状腺癌的最理想的诊断措施，正确率可以达到100%。颈部甲状腺的B超和同位素扫描等。

www.Examda.CoM 总之，只有病人自己提高警惕性，早期发现颈前肿物，早期到医院诊断，才有希望得以早期手术根治。更多信息请访问：执业医师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业医师加入收藏

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

