

2010年医师内科辅导：血栓闭塞性脉管炎诊断要点临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_649634.htm 血栓闭塞性脉管炎根据临床特点诊断不难，但应与雷诺综合征、动脉粥样硬化、大动脉炎、糖尿病性坏疽进行鉴别。为了明确血管闭塞部位、性质和程度需作下列检查。（一）肢体抬高试验 来源

：www.examda.com 患肢平卧，下肢抬高45°，3分钟后观察足部皮肤皮色改变，如颜色苍白为阳性体征，然后下肢下垂再观察变化，如颜色潮红或青紫为阳性。阳性为血供不足。

（二）解张试验 <http://ks.100test.com> 对比硬膜外阻滞麻醉前后患肢温度变化，温度升高越明显，则痉挛因素越大；如无改变，说明血管已闭塞。（三）多普勒超声检查 了解病变部位和缺血程度。（四）动脉造影 了解闭塞部位与侧支循环建立情况。更多信息请访问：执业医师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com