

2010年口腔医师粘膜病：副肿瘤性天疱疮的治疗口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/649/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_649696.htm 皮肤黏膜病损的治疗效果和预后与肿瘤的性质有一定关系。良性肿瘤者经切除后，皮肤黏膜病损可得到缓解、改善甚至完全消退。而恶性肿瘤患者多数病情呈进行性发展，预后不良。来源:百考试题网 在控制和治疗肿瘤的同时，可使用肾上腺皮质激素及细胞毒类药物治疗。一般而言皮肤损害治疗效果优于黏膜损害。由于药物可能导致多种不良反应，患者应定期做相关指标的检测和专科会诊。常用药物有泼尼松[1~2mg/(kg.d)]、环磷酰胺[50mg/(kg.d)]，静脉滴注，连续应用4天)、硫唑嘌呤[1~3mg/(kg.d)]，也可采用血浆置换疗法和静脉内免疫球蛋白疗法[400mg/(kg.d)]，静脉滴注，每月连续3~5天].外用药物类似于天疱疮的治疗。患者若出现脓毒血症、重度营养不良、呼吸衰竭等严重并发症应积极进行对症治疗。更多信息请访问：百考试题医师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com