

2010年医师内科辅导：肺转移瘤的x线检查临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_650124.htm

1)血行肺转移瘤： 典型表现两肺多发，大小不等的球形病灶，边缘光滑，密度均匀，中下肺野多见。 两肺广泛弥漫性粟粒状阴影，边界模糊。单个较大的结节病灶，边缘光整，可呈分叶状，密度均匀，以结肠癌最多见。 病变可发生空洞或钙化，空洞以头颈及生殖系统的鳞癌多见，钙化多见于骨肉瘤、软骨肉瘤。 可以发生自发性气胸，多见于骨肉瘤或纤维肉瘤。 极少数表现为肺动脉高压。 肺炎型转移罕见，表现为片状模糊影，多见乳腺癌转移。 支气管转移亦罕见，肾癌和结肠常见，表现为支气管狭窄及阻塞征象。 2)淋巴转移： 一侧或双侧纵隔，肺门淋巴结肿大。 肺纹理增强，沿肺纹理见纤细的条状影伴随着细小结节或网状影。 常见间隔线(Kerley
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com