

2010年外科辅导：尿瘘是由什么原因引起的临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_650153.htm

(一) 产伤：是引起尿瘘的主要原因。异常产第二产程延长，阴道前壁、膀胱及尿道被过分挤压于胎头与耻骨之间，致软组织发生水肿、缺血、坏死脱落，最后可形成瘘。常于产后一周左右开始漏尿。来源

：www.100test.com (二) 手术创伤：难产手术助产，可因指征、条件未掌握好，或因操作粗暴，损伤了阴道、膀胱、尿道或直肠，立即漏尿或大便，如不修复，即形成尿瘘或粪瘘。盆腔或阴道妇科手术，尤其是肿瘤根治手术，如操作不细致，均可损伤膀胱或输尿管而形成瘘。(三) 其它原因：少数系因癌肿转移、放射治疗损伤及结核等引起。更多信息请访问：执业医师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：尿瘘应该如何治疗 2010年中药鉴定中药材：尿道损伤是由什么原因引起的 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com