

2011临床执业医师考试：卵巢两性母细胞瘤早期症状 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2011_E4_B8_B4_E5_BA_8A_c22_650590.htm

卵巢两性母细胞瘤早期症状：盆腔包块，内分泌变化！

1.盆腔包块 两性母细胞瘤多发生于单侧卵巢，平均直径6cm以下，通过仔细的盆腔检查及B超等辅助检查，大多数附件区实性占位性病变可以被发现。但是McCluggage等（1996）报道的一例肿瘤重1490g，体积达21cm × 14cm × 10cm.

2.内分泌变化 由于肿瘤由颗粒-泡膜成分和支持-间质成分组成，瘤细胞可以分泌雌激素，亦可以分泌雄激素，因此临床上出现内分泌变化的多种表现。

（1）雌激素影响：可以出现月经过多、绝经后出血等临床症状，以及子宫增大、子宫内膜增生性病理改变。

（2）雄激素影响：闭经、乳腺萎缩、多毛、声音低哑、阴蒂肥大等男性化症状，会在部分患者出现。

（3）亦有男、女性症状均存在或先后出现症状者。由于肿瘤十分罕见，临床上出现的内分泌紊乱症状较难以与其他类型的卵巢性索间质肿瘤加以鉴别，术前诊断十分困难。

特别推荐：[2011年临床执业医师考试报名须知](#) [2011年临床执业医师考试大纲](#) [2011年临床执业医师考试网校辅导](#) [2011年临床执业医师考试要](#)

点：[宫颈外翻汇总](#) [2011年临床执业医师考试要](#)

点：[宫颈外翻汇总](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com