

2011年医师实践技能考试：压迫止血的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/650/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_650859.htm

对较大血管出血一时无法显露出血点时，可暂时压迫出血，在辨明出血的血管后，再进行结扎止血！压迫止血的方法是临床医师实践技能考试要求掌握的内容，百考试题医师实践技能站搜集整理相关内容供大家参考。适用于较广泛的创面渗血；对较大血管出血一时无法显露出血点时，可暂时压迫出血，在辨明出血的血管后，再进行结扎止血。

- 1.一般创面用干纱布直接压迫出血数分钟，即可控制止血。
- 2.渗血较多时，可用热生理盐水纱布压迫创面3~5分钟，可较快控制渗血。
- 3.出血量大、病情危急时，可用纱布条或纱布垫填塞压迫止血，一般3~5天病情稳定后再逐步取出。
- 4.局部药物止血法：用可以吸收的止血药物填塞或压迫出血、渗血处，以达到止血目的。常用的有明胶海绵、羧甲基纤维素纱布及中草药提取的止血粉等。
- 5.骨髓腔出血时。可用骨蜡封闭止血。

特别推荐：[#0000ff>2011年执业医师实践技能考试报名时间](#) [#0000ff>2011年医师实践技能考试大纲汇总](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011年实践技能考前网上辅导](#) 相关链接：[#0000ff>2011临床医师实践技能备考：肝大概述](#) [#0000ff>2011临床医师实践技能备考：肝大体格检查](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com